PROGRAMME
DE RECHERCHE

RÉSILIENCE
DES FORÊTS

Suivi des forêts

Projet ciblé MONITOR, « Système agile de monitoring écologique des forêts »

Responsables : Jerome Chave (CNRS)
Camille Piponiot (CIRAD)

Intervenants: Martin Schwartz (LSCE)
Kevin Darras (INRAE)
Caroline Bedeau (ONF Guyane)

Bordeaux, 18 septembre 2024

Monitoring des forêts et télédétection

Objectif: tester des méthodes innovantes pour cartographier l'état et le changement des forêts françaises.

Cartographie des forêts à l'aide de l'apprentissage profond.

Attribution des causes de la disparition des forêts

Suivi des forêts dans les territoires français d'outre-mer.

Schwartz et al., 2023

Suivi de la diversité forestière

Objectif: suivi et modélisation de nouvelles métriques de la diversité des forêts.

Biodiversité des oiseaux et des chauves-souris dans les forêts.

Biodiversité du sous-étage et microclimat.

Amélioration du suivi de la biodiversité dans les forêts protégées.

Modélisation de la dynamique de la biodiversité forestière.

Dynamique passée des forêts françaises

Objectif: intégrer des analyses des changements de couvert forestier et de leurs causes sur le temps long.

Changements à long terme dans la distribution, la composition et la dynamique des forêts.

Enquêtes paléo-environnementales intégratives dans les forêts.

Stolze et al., 2015

Téledétection et surveillance des forêts

Martin Schwartz, Post-Doc au Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement (LSCE)

Thèse : Cartographie à haute résolution de la hauteur et de la biomasse des forêts françaises à l'aide de télédétection spatiale et d'apprentissage profond

Information spatiale à haute résolution

Modèle de Deep Learning

Carte de hauteur à haute résolution

Données d'entraînement

Hauteur GEDI

L'apport du Deep Learning

- Permet d'extraire la **texture** et le **contexte** de l'image à **plusieurs échelles**

- ~ **17 Millions** de paramètres à ajuster

- Particulièrement adapté aux **gros jeux de données** (GEDI)

Résultats : Carte de France des hauteurs à 10 m de résolution

+ Passage au volume et à la biomasse avec des équations allométriques

Résultats : Comparaison aux données terrain

Inventaire Forestier national, 2020, IGN (5 475 plots)

Réseau RENECOFOR, ONF

Limites et enjeux

- De grands écarts de biomasse et volume avec certaines données terrain
- Des prédictions plus difficiles à expliquer avec le deep learning
- Complémentarité de l'utilisation de la télédétection et des données de terrain

Perspectives pour le PC Monitor

- Cartes annuelles pour étudier les changements de hauteur/biomasse (depuis 2015)

- Haute résolution avec données Planet / SPOT et LiDAR aéroporté

Perspectives pour le PC Monitor

- Cartes annuelles de hauteur et biomasse depuis 40 ans avec Landsat (30 m res.)
- Modèles de fondation : Nouveaux modèles de deep learning plus performant et multi-tâches (Fayad et al. *in prep*)
- Courbes de croissances post-perturbation selon les espèces (Pellissier-Tanon et al., 2024)
- Cartes d'espèce, Cartes de perturbation avec attribution
- Budget Carbone annuel de la France à l'aide des cartes et comparaison aux données terrain

- Application aux zones tropicales (Guyane)

Merci pour votre attention

martin.schwartz@lsce.ipsl.fr

Suivi acoustique passif des oiseaux et chauves-souris

Sur dispositif RENECOFOR
Dans le cadre du PC2 MONITOR

Kevin FA Darras, EFNO
lancement PEPR FORESTT
Bordeaux, 18 septembre 2024

La biodiversité forestière animale – négligée?

- **Écologique** : La faune dépend de la biodiversité florale mais agit aussi sur elle
- **Légal** : Obligation de faciliter son adaptation au changement climatique (Trouwborst, 2011)
- **Technologique** : Suivi standardisé des vertébrés volants à grande échelle et sur le temps long manquant

"we limit our discussion to botanical aspects of forests"

Questions scientifiques

- Les répartitions et la démographie des oiseaux et chauves-souris subiront d'importants changements
- Avenues de recherche:
 - Résilience aux événements extrêmes
 - Réponse comportementale au microclimat
 - Couplage phénologique à la végétation
 - ...(en fonction de l'essence dominante)

Enveloppes climatiques prédites oiseaux (Huntley et al. 2008)

B Demographic responses

Réponses démographiques chauves-souris (Festa et al. 2022)

Suivi acoustique passif

- S'inscrit dans l'écoacoustique, qui étudie l'écologie par les sons environnementaux
- Taxons forestiers dans l'audible et ultrasonore, actifs de nuit et de jour:

Fringilla coelebs, By Kamran Safi, CC BY-SA 4.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=71143379>

Nyctalus noctula, By Andreas Trepte - Own work, CC BY-SA 2.5,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15264293>

Cyrtaspis scutata female,
By Gilles San Martin from Namur, Belgium, CC BY-SA 2.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=54627381>

Hyla arborea By Stijn99 - Own work, CC BY-SA 4.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=75232676>

Matériel et déploiement

- Contraintes techniques:
alimentation électrique,
intempéries, stockage et analyse
de données...
- Solutions:
 - Audiomoth-dev + Li-ion 10 Ah
 - Échantillonnage @ 250 kHz, 1/15 min
 - Identification IA (BirdNET, batdetect2)

Audiomoth 1.2 dans boîtier
sur placette CHS

Audiomoth-dev

Calibration spatiale et standardisation données IA

Les portées
acoustiques sont
variables (Darras et al.
2016, Hauptert et al. 2022)

Source de bruit omnidirectionnelle
(Somervuo et al. 2023)

Sans correction, les résultats de
l'IA sont biaisés (Wood & Kahl, 2024)

Flux des données

Expérimental:

- Pré-filtrage voix humaines
- Calcul des portées
- Standardisation données IA

Résultats de l'étude pilote

- juillet-août 2024
- >1 semaine d'enregistrement
- Placettes Chênes sessiles
RENECOFOR

<https://ecosound-web.de/>

Exemple d'analyse (bioacoustique)

- Prédiction de l'activité acoustique de l'oreillard gris avec:
 - température
 - précipitation
 - placette

Remerciements et références

Frédéric Archaux, Marion Gosselin, Sarah Berthomieu, Manuel Nicolas, Yves Bas, Luc Barbaro

- Trouwborst, A., 2011. Conserving European Biodiversity in a Changing Climate: The Bern Convention, the European Union Birds and Habitats Directives and the Adaptation of Nature to Climate Change. *Review of European Community & International Environmental Law* 20, 62–77. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9388.2011.00700.x>
- Huntley, B., Collingham, Y.C., Willis, S.G., Green, R.E., 2008. Potential Impacts of Climatic Change on European Breeding Birds. *PLOS ONE* 3, e1439. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0001439>
- Somervuo, P., Lauha, P., Lokki, T., 2023. Effects of landscape and distance in automatic audio based bird species identification. *The Journal of the Acoustical Society of America* 154, 245–254. <https://doi.org/10.1121/10.0020153>
- Wood, C.M., Kahl, S., 2024. Guidelines for appropriate use of BirdNET scores and other detector outputs. *J Ornithol.* <https://doi.org/10.1007/s10336-024-02144-5>

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Importance des suivis forestiers pour la forêt guyanaise

ONF – Pôle RDI Cayenne – Caroline Bedeau

18/09/2024

Contexte de la forêt guyanaise

- Superficie Guyane : ~ 8.4 M ha
- Taux de boisement 96%
- Superficie gérée par l'ONF : ~ 6 M ha
- Contexte Amazonien – région Plateau des Guyanes

Une méga-biodiversité forestière

Reconnue mondialement comme un fort enjeu environnemental

Un enjeu carbone fort

Carbone aérien stocké dans les forêts de Guyane ≈ celui des forêts de métropole

Un pilier du développement endogène

Forte demande locale en bois de construction, contribution à la production d'électricité (connexes bois énergie), produits forestiers non ligneux, ...

Fonctions traditionnelle et sociale importantes

- Un territoire encore largement préservé
- Une gestion multifonctionnelle et durable

L'ONF acteur de la gestion durable des forêts guyanaises

- Assurer la préservation des milieux et de la biodiversité :
Zones de protection : Réserves naturelles et biologiques, ...
 - Organiser et contrôler les activités anthropiques légales :
Suivi de l'activité minière : Observatoire des Activités Minières, ...
Production de bois : cadre PEFC et Exploitation à Faible Impact, règles sylvicoles ...
 - Lutter contre les activités illégales :
Orpaillage clandestin, Occupations et défriches illégales, ...
- Amélioration continue des cadres et pratiques de gestion :
- Connaître le fonctionnement écologique des forêts
 - Comprendre et anticiper les effets des changements climatiques et leurs effets combinés avec l'exploitation forestière
- Nécessité de disposer d'indicateurs sur les effets de la gestion et l'état des forêts, et les rapporter

Actuellement pas d'Inventaire Forestier National en Guyane

Importance de la recherche pour la gestion forestière en Guyane

- Service dédié R&D au sein de l'ONF : département RDI / pôle Cayenne
- Partenariat fort et continu avec structures de recherche (CIRAD, CNRS, IRD, INRAE...)
- Contribue au développement des connaissances fondamentales à la gestion
- Forte part de recherche appliquée

Importance de la recherche pour la gestion forestière en Guyane

➤ Quelques exemples

Réseau GUYAFOR

Partenariat CIRAD-ONF-CNRS

- Inventaires réguliers
- Placettes Forêts non perturbée et exploitée

~ 300 ha

> 260 000 arbres ($\varnothing > 10$ cm)

> 2,2 millions de mesures

+ stratégie données télédétection (lidar) en cours

- Dispositif indispensable pour les modèles de structure, dynamique, flux carbone, diversité, effets des CC ...
- Applications directes dans la gestion : orientations & règles sylvicoles actuelles ... et futures

Projets GFCLim, ManagForRes

- Mutualisation pantropicale TmFO + Geo-Trees

Importance de la recherche pour la gestion forestière en Guyane

➤ Quelques exemples

Modèles et Cartographies « wall-to-wall »

Habitats forestiers (Guitet *et al.* 2015)

Sols (non publié)

Biomasse (Fayad *et al.* 2015)

Dynamiques forestières (Sabatier *et al.* 2017)

...

- Moyenne / basse résolution
- Incertitudes relativement fortes
- Temporalité : « one-shot »

➤ Données de référence uniques et largement réutilisées

mais pas/peu de perspective temporelle

Fig. 12. a) carte des dynamiques forestières et dispositifs de gestion-conservation, b) pluviosité TRMM 1998-2008 - c) paysages géomorphologiques (Guitet *et al.* 2013)

Dynamique forestière et dispositifs de gestion-conservation

Catalogue et cartographie des habitats forestiers guyanais (Guitet *et al.* 2015)

Légende

- Hors forêt
- Forêt des plaines et dépressions**
 - Forêts côtières des terres basses
 - Forêts sur cordons sableux
 - Forêts côtières des terres hautes
 - Forêts littorales sur rochers
 - Forêts sur sables blancs
 - Forêts de la péninsule intérieure
 - Forêts sur djougoung-pété
- Forêts des collines**
 - Forêts des basses vallées
 - Forêts des collines irrégulières
 - Forêts des collines régulières
 - Forêts des collines peu élevées
- Forêts des plateaux et haut-reliefs**
 - Forêt des plateaux réguliers
 - Forêts sur Inselberg (inventaire 2001)
 - Forêts des plateaux irréguliers
 - Forêts des plateaux élevés
 - Forêts des moyennes montagnes
 - Forêts sub-montagnardes
- Forêts marécageuses**
 - Forêts ripicoles, de bas-fonds, de talwegs humides
 - Forêt de transition (écotones - faciès humide)
 - Mangroves

Fayad *et al.* 2015

MONITOR : Attentes & Perspectives

- Télédétection déjà largement utilisée à l'ONF et en Guyane pour l'aménagement, le suivi des couverts forestiers, la préparation des coupes...
... mais pas de compilation des différents initiatives / suivis
- Quantité et diversité de données disponibles en Guyane +++
 - Guyafor
 - Données d'exploitation (inventaires avant exploitation, suivi des prélèvements ...)
 - Télédétection : Lidar, satellitaire (station SEAS Guyane)
 - Et produits issus de leurs traitements : Suivi des surfaces impactées par les activités minières et forestières, détection des déboisements Sentinel-1 ...
- **Apports du PC MONITOR :**
 - Appuyer les efforts déjà existants sur GUYAFOR
 - Développer un system de suivi forestier robuste, à haute résolution spatiale et temporelle, couvrant tout le territoire
 - Consolider des indicateurs existants et en déployer de nouveaux
 - Intégrer la dimension temporelle et le long-terme
 - Intégrer la dimension sanitaire et la notion de dégradation forestière

= Renforcer les indicateurs de base nécessaires à la gestion forestière

Lidar aérien ONF depuis 2012

Office National des Forêts

Merci pour votre attention.